



- א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים  
ב. בגרות לנבחנים אקסטרנליים
- תשע"ג, מועד ב**  
מספר השאלה: 316,035806  
דף נוסחאות ל-5 ייחדות לימוד  
נספח:

**מדינת ישראל**  
משרד החינוך

## מתמטיקה

### 5 ייחדות לימוד — שאלון ראשון

#### הוראות לנבחן

- א. משך הבחינה: שלוש שעות וחצי.
- ב. מבנה השאלה ופתח ההערכה: בשאלון זה שלושה פרקים.  
 פרק ראשון — אלגברה והסתברות  
 פרק שני — גאומטריה וטראיגונומטריה  
 פרק שלישי — חישוב דיפרנציאלי ואיינטגרלי  
 סה"כ — 100 נקודות
- $\frac{1}{3} \text{ נקודות}$
- $\frac{2}{3} \times 2 = 16$
- $\frac{1}{3} \text{ נקודות}$
- $\frac{2}{3} \times 2 = 16$
- $\frac{1}{3} \text{ נקודות}$

ג. חומר עוז מותר בשימוש:

- (1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון הנitin לתכנות.  
 שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.  
 (2) דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

- (1) אל תעתיק את השאלה; סמן את מספורה בלבד.  
 (2) התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במחברת את שלבי הפתרון, גם כאשר החישובים מתבצעים בעוזרת מחשבון.  
 הסבר את בל פעולותין, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.  
 חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בזכיון או לפסילת הבחינה.  
 (3) לטiotה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.  
 שימוש בטiotה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

הערה: קישורית לדוגמאות תשובה לשאלון זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.  
**ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות לנבחנים אחד.**

ב ה צ ל ח ה !

המשך מעבר לדף ◀



## השאלות

**שים לב!** הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה.  
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בזכיון או לפיטילת הבחינה.

### פרק ראשון – אלגברה והסתברות ( $\frac{1}{3}$ נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 1-3 (לכל שאלה –  $\frac{2}{3}$  נקודות).

**שים לב!** אם תענה על יותר משתי שאלות, ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

ראובן ושמعون חופרים יחד תעלה אחת ב- 12 שעות.

אם רAOBן CHOPר FOR לבד  $\frac{1}{3}$  מהתעלה, ולאחר שהוא מסיים את חלקו שמעון CHOPר FOR לבד את יתר התעלה, החפירה מסתיימת כעבור  $\frac{1}{3} 23$  שעות.



כמה תעלות שלמות לכל היוטר יCHOPר FOR רAOBן לבד בפחות מ- 100 שעות? התעלות זהות לתעלה הנתונה.

הספקי העבודה של שמעון ושל רAOBן אינם משתנים.

1.

נתונה סדרה  $a_n$ :

$S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ :  $S_n = \dots$

$S_n$  הוא סכום  $n$  האיברים הראשונים בסדרה  $a_n$ .



$b \neq 0$ ,  $S_1 = 3$ ,  $S_{n+1} = b \cdot S_n + 3$  מקיימת לכל  $n$  טבעי:

א. הוכח כי הסדרה  $a_n$  היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא  $b$ .

ב. נתון כי  $|b| < 1$ .

I.  $a_3, a_7, a_{11}, a_{15}, \dots$  : II.  $a_1, -a_3, a_5, -a_7, \dots$

T הוא הסכום של אינסוף איברי הסדרה I,

M הוא הסכום של אינסוף איברי הסדרה II.

הבע באמצעות T את היחס  $\frac{M}{T}$ . פשט את הביטוי ככל האפשר.

המשר בעמוד 3




3. מבין כל תלמידי י"ב בעיר מסוימת מאטרים תלמידים שיתאימו לקורס ייחודי. הקורס מתאים לתלמידים שיש להם יכולת טכנית. הבוחנות מאבחנות 80% מבין התלמידים שאכן יש להם יכולת טכנית כבעלי יכולת טכנית, ומאבחנות 10% מבין התלמידים שאין להם יכולת טכנית כבעלי יכולת טכנית. מבין התלמידים שאובחנו כבעלי יכולת טכנית, אחוז התלמידים שאכן יש להם יכולת טכנית גדול פי 4 מאשר התלמידים (בקבוצה זו) שאין להם יכולת זו.
- א. מהי ההסתברות שלתלמיד י"ב בעיר זו אכן יש יכולת טכנית?
- ב. באותה עיר כל אלה שאובחנו כבעלי יכולת טכנית השתתפו בקורס, ורק הם. בעיר יש 600 תלמידי י"ב. מבין המשתתפים בקורס לכמה תלמידים אין יכולת טכנית?



## המשך בעמוד 4

**פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור** ( $\frac{1}{3}$  33 נקודות)ענה על שתיים מהשאלות 4-6 (לכל שאלה —  $\frac{2}{3}$  נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.



4. נתונה מקבילית ABCD.


הצלע AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה F.

המשך הצלע CB משיק למעגל בנקודה G

(ראה ציור).

נתון:  $AF = AD$ 

א. הוכח כי הנקודה F נמצאת על הישר DG.

ב. נתון גם:  $FC \perp DC$ ,  $BO = BC$ .. (1) הוכח כי  $OF = FC$ . (2) הוכח כי  $FB = \frac{1}{2}BO$ 

5. מרובע ABCD חסום במעגל.

המייתר BD חוצה את הזווית ABC (ראה ציור).

נתון:  $BC = 3\sqrt{3}$ ,  $AB = \sqrt{3}$ .  $\angle ADC = 120^\circ$ 

א. (1) מצא את גודל הזווית ABD.

. (2) מצא את אורך המיתר BD.


ב. נקודה K נמצאת על המיתר BD

כך ש-  $\triangle ABK \sim \triangle DBA$  בהתאם.

מצא את שטח המשולש ABK

.

המשך בעמוד 5



- נתון טרפז שווה-שוקיים ABCD ( $AD = BC$ ) .  
השוק AD היא קוטר במעגל שמרכזו O.  
השוק BC משיקה למעגל בנקודה F.  
המעגל חותך את הבסיס DC בנקודה E (ראה ציור).  
נתון:  $\alpha = \angle BCD$ .  
א. הבע באמצעות  $\alpha$  את גודל הזווית  $FOD$ .  
ב. (1) הבע באמצעות  $\alpha$  את גודל הזווית  $ODF$ .  
(2) הבע באמצעות  $\alpha$  את היחס  $\frac{DE}{DC}$ .



**פרק שלישי – חישוב דיפרנציאלי וaintegraliy של פולינומים,  
של פונקציות שורש, של פונקציות רצינליות  
ושל פונקציות טריגונומטריות (33 נקודות)**

ענה על שתיים מהשאלות 7-9 (לכל שאלה –  $\frac{2}{3}$  נקודות).  
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

- נתונה הפונקציה  $f(x) = x^2 - \cos \frac{x}{2}$  בתחום  $2\pi \leq x \leq 5\pi$ .  
א. (1) מצא תחומי עלייה וירידה של פונקציית הנגזרת  $(x)f'$  (אם יש כאלה) בתחום הנתון.  
(2) הראה כי פונקציית הנגזרת  $(x)f'$  חיובית בתחום הנתון.  
(3) רק על פי התשובות לתרגילים (1) ו(2), סרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת  $(x)f'$  בתחום הנתון.  
(4) כמה פתרונות יש למשוואת  $= 40 = (x)f'$  בתחום הנתון? נמק.  
ב. (1) רשום את הערך המקסימלי של פונקציית הנגזרת השנייה  $(x)f''$  בתחום הנתון.  
(2) האם השטח, המוגבל על ידי הגראף של פונקציית הנגזרת  $(x)f'$  ועל ידי הגראף של פונקציית הנגזרת השנייה  $(x)f''$  בתחום הנתון, שווה לערך של האינטגרל המשוים  $\int_{2\pi}^{5\pi} (f'(x) - f''(x)) dx$ ? נמק.



◀ המשר בעמוד 6





8. נתונה הפונקציה  $(x)f$  המוגדרת לכל  $x$ , ונתונה הפונקציה  $(x)g$ .

$$\text{נתון: } \int_0^1 g(x) dx = 0 , \quad g(x) = k + 2x , \quad k \text{ הוא פרמטר.}$$



א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  $(x)g$  עם הצירים.

ב. נתון גם כי בתחום  $0 \leq x$  מתקיים:  $f(x) \geq g(x)$  ,  $f(x) > 0$  ,  $f'(x) = k$  .


سرטט באותה מערכת צירים סקיצה של הפונקציה  $(x)g$  וסקיצה של הפונקציה  $f(x)$  בתחום  $0 \leq x$  . נמק.

ג. בתחום  $0 \leq x$  איזה שטח גדול יותר: השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  $(x)f$  והציר  $x$  או השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  $(x)g$  ?  $x = 1$  ? נמק.

ד. נתון גם:  $f(x) = x^3 + 3x^2 + ax + f(0)$  ,  $a$  הוא פרמטר,

הגרף של  $(x)g$  משיק לגרף של  $(x)f$  בנקודה הנמצאת בתחום  $0 \leq x$  .

מצא את הפונקציה  $(x)f$  .



9. דני יצא מנקודה A , הנמצאת בשדה

במרחק 1 ק"מ מהכביש BC .

הוא הלך בשדה בקו אלכסוני

במהירות קבועה ,



והגיע לכביש BC בנקודה כלשהי N (ראה ציור).

דני הלך בכביש מהמהירות הגדולה פי  $\frac{13}{12}$  מהמהירות שבה הלך בשדה, והגיע

לנקודה C בכביש.

המרחק בין B ל- C הוא 6 ק"מ.

מהו אורך המסלול ANC אם ידוע שדני עבר אותו בזמן המינימלי?

## בצלחה!

רכות היוצרים שמורה למדינת ישראל  
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

